


Météo de l'herbe du 20 Mars 2018

Reprise de la saison de mesures

Avec une météo plus que capricieuse et très variable, entre épisodes pluvieux ou froids, les rares périodes favorables à la pousse s'avèrent insuffisantes pour assurer un bon démarrage de la végétation. En secteur de plaine, les parcelles de pâturage les plus avancées (8 cm d'herbe herbomètre) doivent rapidement permettre la mise à l'herbe (premier tour rapide sur toutes les parcelles), à condition d'avoir un sol suffisamment ressuyé et porteur, qui reste capital pour préserver le potentiel herbager du printemps !



Repères conduite du troupeau : du 12 au 19 Mars 2018

| | 39 Foin | 39 Ensilage | 25-90 Foin | 25-90 Ensilage | 70 Foin / Enrubannage | 70 Ensilage |
|----------------------------------|---------|-------------|------------|----------------|-----------------------|-------------|
| Lait moyen / vache traite (kg) | 22,9 | 24,7 | 23,9 | 25,3 | 21,3 | 25,9 |
| TB Moyen (g/kg) | 37,3 | 40,9 | 37,8 | 40,6 | 39,4 | 40,3 |
| TP Moyen (g/kg) | 32,5 | 33,7 | 32,6 | 33,2 | 32,2 | 33,7 |
| Valorisation ration de base (kg) | 10,2 | 12,0 | 11,6 | 14,0 | 9,9 | 14,0 |
| Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) | 79,3 | 74,1 | 75,3 | 59,5 | 77,1 | 67,2 |
| g de concentrés / kg de lait | 254 | 243 | 239 | 200 | 244 | 218 |

Point de vue de l'éleveur : Fabien MARILLER – GAEC DES 3 PRAIRIES à BALANOD (Plaine 39)

« En 2017 nous avons produit 25 kg de lait par vache par jour en moyenne avec 2.5 kg de céréales et 0,5 kg de ttx au printemps puis 3 kg de céréales et 1,5 kg de ttx l'été (nous avons consommé autant de concentrés qu'en 2016 mais avec 12 vaches de plus). Nous sommes allés également à l'affouragement en vert pendant 55 jours (en 3 périodes). Pour cette année nous avons récupéré 10 ha de pâturage ce qui porte notre surface à 70 ares par vache (55 ha pour 80 VL), nous avons donc bon espoir de nous passer d'affouragement tout en maintenant notre niveau de production. Nous avons semé des mélanges avec une part de dactyle ces dernières années mais nous pâtureons ces parcelles assez souvent (15 jours environ) pour ne pas se faire déborder par cette plante qui nous soutient bien lors des périodes de faibles croissances estivales. Pour l'instant nous n'avons pas la portance pour sortir mais on sent que la croissance va venir très vite dès que les températures vont remonter. Rdv en fin de saison pour voir si notre objectif de 0 affouragement est rempli ! » Témoignage recueilli par EVA JURA.