


Météo de l'herbe du 27 juin 2017

Retour de la pluie attendu !

La croissance d'herbe est quasi stoppée, surtout en sols superficiels suite à la période caniculaire.

Le retour des précipitations devient urgent pour relancer la pâture. Les éleveurs ayant bien géré leur pâture tournant ont pu préserver quelques jours d'avance d'herbe. Surveillez l'abreuvement des troupeaux en cette période estivale ou les zones d'ombrage sont appréciées.



Repères conduite du troupeau : du 19 au 26 juin 2017

	39 Foin	39 Ensilage	25-90 Foin	25-90 Ensilage	70 Foin / Enrubannage	70 Ensilage
Lait moyen / vache traite (kg)	21,0	22,7	21,8	23,4	19,6	23,7
TB Moyen (g/kg)	35,7	38,3	36,3	37,6	36,4	37,1
TP Moyen (g/kg)	31,7	32,3	31,7	31,7	31,3	32,0
Valorisation ration de base (kg)	12,8	11,1	14,6	15,0	13,6	13,7
Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)	48,8	70,0	42,2	52,8	45,4	53,1
g de concentrés / kg de lait	178	226	152	155	146	167

Point de vue de l'éleveur : Nicolas PELCY, du GAEC de la Barre à LA BARRE (70)


"Depuis cette année je mesure mes paddocks toutes les semaines avec l'herbomètre. Nous n'atteignons que 3 jours d'avance à cause des conditions météo plutôt séchantes. Les 87 VL tournent sur 35 Ha. L'alimentation est composée de 4 kg de concentrés, et depuis cette semaine de 2 kg de foin. Les taux se maintiennent bien : 38 g/l TB et 35 g/l TP.

Tous les paddocks ont été fauchés une fois pour les refus. Au niveau des croissances, les prés semés l'année dernière restent productifs, 5 Ha ont été débrayés début juin, avec une grande dominance de trèfle blanc. Avec les pluies annoncées, on espère qu'ils pourront regagner rapidement les parcelles des vaches pour sécuriser les jours d'avance et diminuer le foin à l'auge".


Témoignage recueilli par Vincent RICHARD, conseiller à Haute-Saône Conseil Élevage.

Groupe Herbe Franche-Comté

Courbe de croissance de l'herbe en plaine



Courbe de croissance de l'herbe sur les plateaux



Courbe de croissance de l'herbe en montagne

